

Câncer do colo do útero

Exames periódicos podem identificar lesões antes do câncer.

Brasil: DNA-HPV a cada 5 anos após resultado negativo, conforme a diretriz.



Cena ilustrativa criada com IA. Pessoas fictícias.

Brasil: novo método de rastreamento

O DNA-HPV está sendo implantado para pessoas com colo do útero, de 25 a 64 anos, com atividade sexual prévia.

Onde se utiliza citologia

Após dois exames anuais normais, o intervalo usual é de 3 anos. Resultados alterados precisam de acompanhamento específico.

Como difere do USPSTF?

Dos 21 aos 29 anos: citologia a cada 3 anos.
Dos 30 aos 65: citologia a cada 3 anos, HPV a cada 5 ou ambos a cada 5 anos.

Parar depende do histórico

O encerramento do rastreamento depende dos resultados anteriores e do risco. Imunossupressão, lesão de alto grau prévia ou câncer exigem outra conduta. Vacinação não elimina o rastreamento indicado.

Sem sintomas: siga o rastreamento indicado. Sintomas, exame alterado ou alto risco exigem avaliação específica.

INCA | Rastreamento com DNA-HPV | 2025 | [abrir fonte](#)

USPSTF | Colo do útero | Recomendação final de 2018 | [abrir fonte](#)

Material educativo | Referências: 12/10/2026 | 08/10

Agende sua consulta • WhatsApp (54) 99993-3227